

RVL: RouwVragenLijst

©2001 Boelen, de Keijser en van den Bout

De RouwVragenLijst (RVL) is een vragenlijst over rouwverwerking. De vragenlijst meet de ernst van de symptomen van gecompliceerde rouw na het overlijden van een naaste.

De vragenlijst



Vragen

De RVL bestaat uit 28 uitspraken. Elke uitspraak wordt beantwoord met één van vijf antwoordmogelijkheden: Nooit (1), Zelden (2), Soms (3), Vaak (4) of Altijd (5). Een voorbeelduitspraak is "Ik denk zoveel aan hem/haar dat het moeilijk voor me is om de dingen te doen die ik normaal doe".

Afnameduur

5-10 minuten.

Informanten

Cliënt/patiënt.

Schalen, scoring en normering



De scores worden opgeteld tot een totaalscore. Middels een afkappunt wordt bepaald of sprake is van klinisch significante gecompliceerde rouw.

Psychometrische gegevens



In onderzoek werd een hoge interne consistentie van .94 en een hoge test-hertest betrouwbaarheid .95 gevonden (Boelen, de Keijser & van den Bout, 2001).

Literatuur en verkrijgbaarheid



De RVL is ontworpen door Boelen, De Keijser en Van den Bout en is vrij beschikbaar.

Literatuur

Boelen, P. A., Keijser, J. de, & Bout, J. van den (2001). Psychometrische eigenschappen van de Rouw VragenLijst (RVL). *Gedrag & Gezondheid*, 29, 172-185.

Boelen, P. A., Bout, J. van den, Keijser, J. de, & Hoijsink, H. (2003). Reliability and validity of the Dutch version of the Inventory of Traumatic Grief. *Death Studies*, 27, 227-247. doi: 10.1080/07481180302889

BergOp



Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de hierboven beschreven scores.

➔ Indien u een [licentie](#) bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken.