

# CIWA-Ar: Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol, Revised

© 1989 Addiction Research Foundation

NL versie © 2001 C.A.J. de Jong & A. van Hoek

Met de Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol, revised (CIWA-Ar) wordt de ernst van het alcoholontwenningssyndroom in kaart gebracht. De vragenlijst kan worden opgenomen in de gebruikelijke klinische zorg van patiënten die alcoholontwenning ondergaan en in klinische onderzoeken naar alcoholontwenning.

---

## De vragenlijst



### Vragen

De CIWA-Ar bestaat uit 10 items die ontwenningssymptomen beschrijven. De behandelaar observeert en bevraagt de cliënt en scoort het item op een schaal van 0 tot 7, waarbij 0 staat voor de afwezigheid van het symptoom en 7 voor de meest ernstige vorm van het symptoom. Enkel de laatste vraag, 'Oriëntatie en omneveld bewustzijn', wordt gescoord op een schaal van 0 tot 4. Een voorbeelditem is 'Misselijkheid en braken'.

### Afnameduur

15-25 minuten

### Informanten

Behandelaar

---

## Schalen, scoring en normering



De totaalscore is de opgetelde som van alle scores. Er gelden afkappunten om de score te interpreteren als geen/minimaal, gering/matig of ernstige ontwenning.

---

## Psychometrische gegevens



De CIWA-Ar is (nog) niet beoordeeld door de COTAN.

---

## Literatuur en verkrijgbaarheid



### Literatuur

Sullivan, J. T., Sykora, K., Schneiderman, J., Naranjo, C. A., & Sellers, E. M. (1989). Assessment of alcohol withdrawal: the revised clinical institute withdrawal assessment for alcohol scale (ciwa-ar). *British Journal of Addiction*, 84, 1353-1357.

---

## BergOp



Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de hierboven beschreven scores.

→ Indien u een [licentie](#) bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken.